Phleum phleoides

tymotka Boehmera







Trawa występująca naturalnie w Polsce, a także w Azji i Afryce, dorastająca w czasie kwitnienia do 70 cm wysokości. Tworzy niewielkie kępy wąskich, zielonych liści z których wyrastają bardzo liczne, sztywne, czerwonofioletowe źdźbła zwieńczone zwartymi, walcowatymi kwiatostanami. Początkowo kwiatostany są zielone, po kwitnieniu brązowieją. Roślina kwitnie w czerwcu i lipcu, wymaga stanowisk słonecznych, gleb lekkich i przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych lub suchych. Trawa polecana do sadzenia w ogrodach przydomowych, na skalniakach, rabatach bylinowych oraz w ogrodach preriowych i stepowych.

autorzy opisu tekstowego: Grzegorz Falkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Europa, Afryka Północna, Azja
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone

Copyright © 2024 Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone

zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	beżowe zielone
pora kwitnienia	lipiec czerwiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże suche
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa piaszczysta
walory	ciekawy pokrój ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe w grupach rabaty ogrody wrzosowiskowe ogrody skalne
strefa	5

autorzy opisu tabelarycznego: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Phleum phleoides w Polsce*

OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkółka Bylin

Copyright © 2024 Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone