

Phleum phleoides

tymotka Boehmera



Trawa występująca naturalnie w Polsce, a także w Azji i Afryce, dorastająca w czasie kwitnienia do 70 cm wysokości. Tworzy niewielkie kępy wąskich, zielonych liści z których wyrastają bardzo liczne, sztywne, czerwono-fioletowe źdźbła zwieńczone zwartymi, walcowatymi kwiatostanami. Początkowo kwiatostany są zielone, po kwitnieniu brązowieją. Roślina kwitnie w czerwcu i lipcu, wymaga stanowisk słonecznych, gleb lekkich i przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych lub suchych. Trawa polecana do sadzenia w ogrodach przydomowych, na skalniakach, rabatach bylinowych oraz w ogrodach preriowych i stepowych.

autorzy opisu tekstowego: Grzegorz Falkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny Europa, Afryka Północna, Azja

grupa roślin byliny

autorzy opisu tabelarycznego: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Phleum phleoides* w Polsce

DAGLEZJA Artur Maj Szkołka Roślin Ozdobnych
OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkołka Bylin

