Cephalanthus occidentalis SUGAR SHACK 'SMCOSS'

guzikowiec zachodni SUGAR SHACK 'SMCOSS'
nazwa handlowa: *Cephalanthus occidentalis* SUGAR SHACK nazwa hodowlana: *Cephalanthus occidentalis* 'SMCOSS'

Zwarty, mocno rozgałęziony krzew o zaokrąglonym pokroju osiągający rozmiary mniejsze niż rośliny gatunku. Dorasta do około 1,2 m wysokości przy podobnej szerokości. Liście owalno-lancetowate, skórzaste, ciemnozielone i błyszczące, o długości około 8,5 cm i szerokości 3,5-4 cm. Pojawiają się późno, na początku maja, a jesienią przebarwiają się na żółto. Bardzo ciekawe kuliste kwiatostany o średnicy około 2,5 cm pojawiają od połowy lipca do początku września na pędach jednorocznych. Przypominają pompony, są kremowobiałe, lekko pachnące i miododajne. Wabią liczne owady zapylające, w tym pszczoły i motyle. Po przekwitnięciu tworzy dekoracyjne kuliste, czerwone owoce o średnicy około 2 cm, które zdobią rośliny aż do zimy. Kwitnie na pędach tegorocznych, dlatego wiosną wskazane jest krótkie cięcie, które znosi bardzo dobrze. Roślina całkowicie mrozoodporna. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, w stale wilgotnej, a nawet podmokłej, gliniasto-piaszczystej glebie. Odmiana przydatna do ogrodów przydomowych i na tereny zieleni, najlepiej do sadzenia w małych grupach po kilka sztuk. Nadaje się na niewysokie żywopłoty na wilgotnym terenie. Może być wykorzystywana w kompozycjach naturalistycznych, ogrodach bagiennych oraz nad brzegami oczek widnych i strumieni.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Timothy D. Wood Stany zjednoczone; wprowadzenie do handlu: Spring Meadow Nursery Inc. 2016 Stany Zjednoczone
grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste krzewy
forma	krzew

Copyright © 2026 Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone

siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	półkulisty
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	kremowe białe
pora kwitnienia	lipiec sierpień wrzesień
owoce	czerwone ozdobne kuliste
pora owocowania	październik wrzesień listopad
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże wilgotne podłoże podmokłe (bagienne, nadwodne, wodne)
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	piaszczysta przeciętna ogrodowa gliniasta
walory	ciekawy pokrój ozdobne owoce ozdobne z kwiatów roślina wabiąca owady zapylające

Copyright © 2026 Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone

zastosowanie	ogrody przydomowe parki żywopłot ogrody wodne i bagienne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty w grupach soliter (pojedynczo)
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Copyright © 2026 Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone