

Vaccinium corymbosum 'Calypso'

borówka wysoka 'Calypso'

Odmiana krzewu owocowego o dużych, wyrównanych i smacznych owocach, dojrzewających w środku lata. Rośliny dorastają do wysokości około 1,3 m, przy średnicy do 90 cm. Pędy mają wzniesiony pokrój. Liście ciemnozielone, błyszczące, lancetowate o długości 4,5-5 cm i szerokości 2-2,8 cm. Kwiaty białe, dzwonkowate o średnicy 5-7 mm, zebrane w po 8-10 w grona. Pojawiają się w maju. Odmiana częściowo samopylna, ale lepiej owocuje w obecności krzewów innych odmian, np. 'Liberty', 'Bluecrop' lub 'Legacy'. Owoce dojrzewają od początku sierpnia. Są duże o masie około 2,4 g i średnicy 15-17 mm, lekko spłaszczone, fioletowoniebieskie od nalotu woskowego. Są smaczne i soczyste, długo nie opadają po dojzeniu i dobrze się przechowują. Ze względu na pochodzenie z północnych części Stanów Zjednoczonych, ze stanu Michigan, odmiana bardzo odporna na mróz. Krzewy najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, w zasobnej w związki organiczne glebie o odczynie mocno kwaśnym, pH 3,5-5. Wymagają stale umiarkowanie wilgotnej gleby ze względu na szeroki, ale płytki system korzeniowy składający się z cienkich korzeni. Po kilku latach, gdy rośliny zagęszczą się należy wczesną wiosną stopniowo usuwać najstarsze pędy, aby przeświecić krzewy i pobudzić je do tworzenia nowych, silnych pędów. Odmiana do uprawy w ogrodach przydomowych i na plantacjach.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): James F. Hancock USA; wprowadzenie do handlu: Michigan State University 2006 Stany Zjednoczone
grupa roślin	owocowe
grupa użytkowa	krzewy owocowe
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę	
rodzaj kwiatów	kwiatostan pojedyncze
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	maj
owoce	jadalne
	niebieskie
	fioletowe

pora owocowania	sierpień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn kwaśny
rodzaj gleby	próchnicza
walory	jadalne owoce
zastosowanie	owoce mrożone
	owoce na przetwory
	owoce deserowe
	w grupach
strefa	5

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Vaccinium corymbosum* 'Calypso' w Polsce

CIEPŁUCHA Gospodarstwo Szkółkarskie

