Vaccinium corymbosum 'O'Neal'

borówka wysoka 'O'Neal'

Odmiana krzewu owocowego o średniej wielkości, fioletowoniebieskich owocach, ceniona za bardzo wczesną porę dojrzewania. Rośliny mają pokrój wzniesiony, rosną silnie i mogą dorastać do wysokości 1,8 m. Młode pędy często purpurowo zabarwione. Liście zielone lub szarozielone, błyszczące, lancetowate o długości 3-5,5 cm i szerokości około 2,5 cm. Jesienią ładnie przebarwiają się na kolor czerwony i burgundowy. Kwiaty białe, dzwonkowate o średnicy 5-7 mm, zebrane w po 8-10 w grona. Pojawiają się wcześnie w maju. Odmiana samopylna, dobrze plonuje nawet bez obecności innych odmian borówek. Owoce dojrzewają wcześnie, już od początku lipca. Są średnie wielkości, o masie około 1,5 g, kuliste, fioletowoniebieskie z nalotem woskowym. Są smaczne, jędrne i soczyste, przydatne jako deserowe oraz surowiec na przetwory. Ze względu na pochodzenie z południowych części Stanów Zjednoczonych, ze stanu Karolina Północna, odmiana nie do końca odporna na mróz. Podczas ostrych zim może przemarzać, a kwiaty mogą być uszkadzane przez przymrozki wiosenne. Popularna w uprawie towarowej w krajach o cieplejszym klimacie. Krzewy najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, w zasobnej w związki organiczne glebie o odczynie mocno kwaśnym, pH 3,5-5. Wymagają stale umiarkowanie wilgotnej gleby ze względu na szeroki, ale płytki system korzeniowy składający się z cienkich korzeni. Odmiana o wyższej tolerancji na wysokie temperatury latem oraz piaszczyste, ale kwaśne gleby. Po kilku latach, gdy rośliny zagęszczą się, należy wczesną wiosną stopniowo usuwać najstarsze pędy, aby prześwietlić krzewy i pobudzić je do tworzenia nowych, silnych pędów. Odmiana do uprawy w ogrodach przydomowych.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	wprowadzenie do handlu: North Carolina Agricultural Research Service - USDA 1987 Stany Zjednoczone
grupa roślin	owocowe
grupa użytkowa	krzewy owocowe
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	maj

Copyright © 2026 Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone

owoce	jadalne niebieskie fioletowe
pora owocowania	lipiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn kwaśny
rodzaj gleby	próchniczna
walory	jadalne owoce ładne jesienne zabarwienie
zastosowanie	w grupach soliter (pojedynczo) owoce deserowe owoce na przetwory owoce mrożone
strefa	6

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Vaccinium corymbosum* 'O'Neal' *w Polsce*

CIEPŁUCHA Gospodarstwo Szkółkarskie
KUSIBAB-WYKA Aleksandra Gospodarstwo Ogrodnicze

Copyright © 2026 Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone