

Callicarpa bodinieri 'Autumn Glory'

pięknotka Bodiniera 'Autumn Glory'

Krzew liściasty dekoracyjny jesienią ze względu na liczne fioletoworóżowe owoce zebrane w grona, liczniejsze i bardziej skupione niż u gatunku oraz bardziej zwarty, wyprostowany pokrój. Dorasta do wysokości około 2,5 m. Liście eliptyczne, ciemnozielone, z ząbkowanymi brzegami i zaostrowym wierzchołkiem, o długości do 17 cm. Jesienią przebarwiają się na żółto. Kwitnie na pędach jednorocznych w lipcu i sierpniu. Kwiaty małe, niepozorne, liliowe, zebrane w wierzchołkowe kwiatostany w kątach liści. Pojawiają się w lipcu i sierpniu. Od września do października dojrzewają zebrane w gęste grona do 45 sztuk małe kuliste, błyszczące jagody o atrakcyjnym, różowofioletowym kolorze. Są najbardziej widoczne od października, gdy opadną liście. Utrzymują się nieco dłużej niż na krzewach gatunku, zwykle do większych mrozów i ze względu na nieco gorzki smak tylko sporadycznie są zjadane przez ptaki. Krzew niezbyt odporny na mróz. W ostrzejsze zimy może przemarzać do granicy śniegu, ale zazwyczaj łatwo regeneruje i kwitnie oraz owocuje na pędach jednorocznych. Wymaga stanowisk osłoniętych, ciepłych, słonecznych lub tylko lekko ocienionych. Gleba powinna być przepuszczalna, żyzna, umiarkowanie wilgotna. Wiosną najstarsze pędy można skracać o dwie trzecie dla lepszego kwitnienia. Najlepiej sadzić po kilka roślin w grupach, gdyż przy zapyleniu krzyżowym obficie owocują. Odmiana przydana do ogrodów przydomowych i na tereny zieleni, do sadzenia w miejscach, w których widoczne będą jesienią ich atrakcyjne owoce. Zwarte, smukłe pędy owocujące tej odmiany można ścinać do dekoracji.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin

liściaste

grupa użytkowa

liściaste krzewy

forma

krzew

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

krzewiasty wyprostowany

docelowa wysokość

od 2 m do 3 m

barwa liści (igieł)

ciemnozielone

zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów

kwiatostan

barwa kwiatów

lila

pora kwitnienia

sierpień

lipiec

owoce

kuliste

fioletowe

pora owocowania	październik
	wrzesień
	listopad
nastłonecznienie	stanowisko półcieniste
	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa
walory	ciekawy pokrój
	ozdobne owoce
	roślina wabiąca owady zapylające
zastosowanie	ogrody przydomowe
	parki
	zieleń publiczna
	kwiaty cięte
	w grupach
	soliter (pojedynczo)
	ogrody osiedlowe
strefa	6b

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Callicarpa bodinieri* 'Autumn Glory' w Polsce

KUROWSCY Szkółki