

Vaccinium corymbosum 'Last Call'

borówka wysoka 'Last Call'

Amerykańska odmiana krzewu owocowego o średniej wielkości, niebieskich, smacznych i bardzo późno dojrzewających owocach. Rośliny rosną silnie, dorastają do wysokości około 1,5 m. Pędy są sztywne i mają wyprostowany pokrój. Liście ciemnozielone, błyszczące, eliptyczne o długości około 7,5 cm i szerokości 3,6 cm. Kwiaty białe, dzwonkowate o średnicy 5-7 mm, zebrane po około 13 w grona. Pojawiają się na przełomie kwietnia i maja. Owoce dojrzewają równomiernie od końca sierpnia do połowy września, w podobnym terminie co odmiana 'Elliott', a tydzień przed borówką 'Aurora'. Są jasnoniebieskie z nalotem woskowym, średniej wielkości, o masie 2,2-2,5 g i średnicy 17-19 mm. Owoce smaczne, słodkie z nutą kwasowości, aromatyczne. Cechują się dobrą trwałością pozbiorną. Odmiana plenna, o skoncentrowanym dojrzewaniu, przydatna do zbioru mechanicznego. Krzewy są odporne na mróz. Najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, w zasobnej w związki organiczne glebie o odczynie mocno kwaśnym, pH 3,5-5. Wymagają stale umiarkowanie wilgotnej gleby ze względu na szeroki, ale płytki system korzeniowy składający się z cienkich korzeni. Po kilka latach, gdy rośliny zagęszczą się należy wczesną wiosną stopniowo usuwać najstarsze pędy, aby przeświecić krzewy i pobudzić je do tworzenia nowych, silnych pędów. Odmiana przydatna do ogrodów przydomowych oraz na plantacje.

autorzy opisu tekstowego: Gospodarstwo Szkółkarskie CIEPŁUCHA Jan Cieplucha; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): David M. Brazelton, Adam L. Wagner USA; wprowadzenie do handlu: Fall Creek 2013 USA
grupa roślin	owocowe
grupa użytkowa	krzewy owocowe
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę	
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	kremowe białe
pora kwitnienia	kwiecień maj
owoce	niebieskie jadalne

pora owocowania	sierpień wrzesień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn kwaśny
rodzaj gleby	próchnicza
walory	jadalne owoce
zastosowanie	w grupach
	owoce deserowe
	owoce na przetwory
	owoce mrożone
	owoce na soki
strefa	owoce na wino, nalewki
	5b

autorzy opisu tabelarycznego: Jan Cieplucha, Gospodarstwo Szkółkarskie CIEPŁUCHA; , Związek Szkółkarzy Polskich;

