

Chamaecyparis obtusa 'Aurora'

cyprysik tępołuskowy 'Aurora'

Grupa Nana



(C) fot. Grzegorz Falkowski

Wolnorosnący, karłowy krzew o koronie nieregularnej, spłaszczonej, z czasem szeroko stożkowatej. Zabarwienie łusek złotożółte. Po 10 latach uprawy osiąga około 0,8 m wysokości. Wymaga gleb żyznych umiarkowanie wilgotnych lub wilgotnych. Stanowisko słoneczne zimą osłonięte. Odmiana rosnąca podobnie jak 'Nana Gracilis', a różniąc się od niej zabarwieniem łusek. Zastosowanie w ogrodach przydomowych, karłowych kolekcjach roślin iglastych, ogrodach japońskich, wrzosowiskach, patio, uprawach w pojemnikach itp.

autorzy opisu tekstowego: Adam Marosz; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie pierwsza publikacja: H.J. van de Laar 1984 Dendroflora 21; odkrywca, hodowca (selekcjoner): M.Koster and Zonen Boskop, Holandia; wprowadzenie do handlu: J.C. van Klavaren, Boskoop, Holandia po 1980r.

grupa roślin iglaste

grupa użytkowa iglaste

forma krzew



siła wzrostu	roślina wolnorosnąca
pokrój	nieregularny
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	żółte, złociste
zimozieloność liści (igieł)	igły zimozielone
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże wilgotne podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
walory	roślina zimozielona ozdobne z liści/igieł ciekawym pokrojem
zastosowanie	pojemniki, balkony, tarasy rabaty ogrody orientalne ogrody wrzosowiskowe ogrody skalne ogrody przydomowe
strefa	6b

autorzy opisu tabelarycznego: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

