

Chamaecyparis obtusa 'Drath'

cyprysik tępołuskowy 'Drath'



(C) fot. Eugeniusz Pudełek

Ciekawa odmiana pochodzenia niemieckiego wprowadzona do uprawy około 1960r. Tworzy ona wolno rosnące duże krzewy a nawet małe drzewka o regularnym, wzniesionym, stożkowatym pokroju. Rośliny w wieku 10 lat uzyskują ok. 2 m wysokości i 1 m średnicy. Z wiekiem rośliny mogą dorastać nawet do 7 m wysokości. Tworzy ona wyprostowane, bardzo grube (widłakowate), mocno rozgałęzione pędy pokryte szarzielonymi łuskami. Odmiana ta ma mniejsze wymagania uprawowe w stosunku do popularnych odmian cyprysika japońskiego. Preferuje jednak gleby żyzne, próchniczne, dostatecznie wilgotne, o kwaśnym odczynie oraz miejsca osłonięte od wiatru. Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych. Ma dobrą mrozoodporność i może być uprawiana praktycznie w całym kraju. Odmiana 'Drath' najładniej prezentuje się sadzona samodzielnie lub jako dominujący element małych kompozycji złożonych z różnych karłowatych krzewów iglastych. Ze względu na budowę szyszek niektórzy dendrolodzy wskazują na jej duże pokrewieństwo z cyprysikiem Lawsona.

autorzy opisu tekstowego: Wiesław Szydło; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	pierwsza publikacja: H. J. Grootendorst 1969 Dendroflora 15-16; odkrywca, hodowca (selekcjoner): O.H Drath Niemcy; wprowadzenie do handlu: Drath Nurseries ok. 1960 Niemcy
grupa roślin	iglaste
grupa użytkowa	iglaste
forma	drzewo
pokrój	kolumnowy stożkowy
docelowa wysokość	od 5 m do 10 m

barwa liści (igieł) szare, niebieskawe, srebrzyste

zimozieloność liści (igieł) igły zimozielone

nasłonecznienie stanowisko słoneczne

wilgotność podłoże wilgotne

ph podłoża odczyn kwaśny

rodzaj gleby próchniczna
gliniasta

walory ciekawy pokrój
ozdobne z liści/igieł
roślina zimozielona

zastosowanie ogrody przydomowe
szpaler
ogrody orientalne
w grupach
soliter (pojedynczo)

strefa 6a

autorzy opisu tabelarycznego: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;

