

# *Clematis chiisanensis* 'Lemon Bells'


powojnik chisański 'Lemon Bells'

Grupa Atragene

Synonim łaciński: *Clematis koreana* 'Lemon Bells'



(C) fot. Szczepan Marczyński



Pnącze o oryginalnych kwiatach, czepiające się podpór za pomocą ogonków liściowych. Odmiana wyselekcjonowana w Kanadzie, z nasion pochodzących z naturalnego stanowiska *Clematis chiisanensis* w Korei Południowej. Dorasta do 2-3 m wysokości. Liście ciemnozielone z wyraźną teksturą. Ogonki liściowe i młode pędy purpurowe. Kwiaty zwisające, w większości żółte, purpurowe u podstawy, złożone z mięsistych, żebrowanych, ostro zakończonych działek. Kwitnie obficie na zeszl rocznych pędach w V, ale kontynuuje kwitnienie na nowych przyrostach przez całe lato. Od VI zdobią je puszyste, jedwabistoszare owocostany. Najlepiej rośnie na glebach umiarkowanie żyznych, próchnicznych, umiarkowanie wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb podmokłych, zbyt ciężkich, gliniastych oraz zbyt lekkich, piaszczystych. Zalecane miejsca jasno oświetlone, chociaż znosi półcień. Dobrze oświetlone kwiaty lepiej się wybarwiają. Nie wymaga wiosennego cięcia, a jedynie umiarkowanego cięcia korekcyjnego zaraz po zakończeniu kwitnienia. W ogrodzie wymaga podpór złożonych z elementów o średnicy do 1cm. Na tego typu siatkach i kratownicach może osłaniać ogrodzenia i ściany budynków. Może wspinać się po naturalnych podporach np. niedużych drzewach, większych krzewach liściastych i iglastych.

autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

pochodzenie pierwsza publikacja: 1998 Gardens West; American Nurseryman; wprowadzenie do handlu: Kanada

grupa roślin pnącza

grupa użytkowa pnącza

forma	pnące
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	pnące
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	żółte
pora kwitnienia	maj
	czerwiec
	lipiec
owoce	sierpień
	ozdobne
pora owocowania	czerwiec
	lipiec
	sierpień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste
	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa
walory	ozdobne owoce
	ozdobne pędy
	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe
	pnące na pergole, kraty
strefa	6



autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;