

Clematis 'Edward Prichard'

powojnik 'Edward Prichard'

Grupa Heracleifolia

Wysoka bylina o sztywnych, wzniesionych pędach pozbawionych organów czepnych, a jedynie wspierających się o podpory lub inne rośliny, dekoracyjna ze względu na niewielkie, ale liczne, kremoworóżowe i pachnące kwiaty. Tworzy kępy dorastające do wysokości 1-1,2 m przy średnicy do 1 m. Liście ma ciemnozielone, pierzastołożone z 5 głęboko ząbkowanych lub klapowanych listków. Od lipca do września w górnej części pędów, z kątów liści i na wierzchołkach tworzy duże, ale luźne kwiatostany złożone z małych, kremoworóżowych kwiatów o średnicy 3-4 cm. Każdy z nich ma zazwyczaj po 4 lub 5 wąskich działek, ciemniejszych bliżej wierzchołka. Pręciki długie, żółte lub kremowe. Kwiaty mocno i przyjemnie pachną, wabiąc intensywnie pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające. Odmiana uznawana za jeden z najbardziej pachnących powojników. Najlepiej rośnie na stanowiskach osłoniętych od wiatru, słonecznych lub tylko w lekkim półcieniu, w żyznej i przepuszczalnej, przeciętnej glebie. Nie toleruje nadmiaru wilgoci w podłożu, zwłaszcza zimą, co jest częstą przyczyną wypadów roślin. Mimo australijskiego pochodzenia rośliny są u nas w pełni odporne na mróz. Wiosną wszystkie pędy należy wyciąć u nasady. Odmiana polecana do ogrodów przydomowych i na tereny zieleni, do sadzenia na rabatach z innymi bylinami, obok krzewów, o które mogą się wspierać oraz w ogrodach w stylu wiejskim i romantycznym. Najlepiej znaleźć dla roślin miejsce w pobliżu ścieżek lub ławek, aby móc cieszyć się ich zapachem. Kwiaty można ścinać do wazonów.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Russell Prichard Australia; wprowadzenie do handlu: 1950
grupa roślin	pnąca
grupa użytkowa	pnąca
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pachnące kwiatostan pojedyncze
barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	sierpień lipiec wrzesień

nasłonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	próchnicza przeciętna ogrodowa
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody osiedlowe kwiaty cięte rabaty zieleń publiczna ogrody przydomowe
strefa	5

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

