

Clematis 'Henryi'


powojnik 'Henryi'

Grupa Late Large-flowered (incl. Jackmanii & Lanuginosa)

Synonim łaciński: *Clematis* 'Bangholme Belle'



(C) fot. Szczepan Marczyński



Pnącze o atrakcyjnych kwiatach, owijające się wokół podpór za pomocą ogonków liściowych. Jedna z najstarszych odmian wielokwiatowych – wyhodowana w 1855 roku, przez cały czas popularna i ceniona. Osiąga wysokość 3-3,5 m. Kwiaty duże, jedwabistobiałe, ze środkiem wypełnionym pręcikami o kawowych pylnikach na białych nitkach. Rośliny cięte słabo - kwitną obficie w VI i kontynuują kwitnienie do VIII. Rośliny cięte silnie - rozpoczynają kwitnienie miesiąc później, ale kontynuują kwitnienie do IX. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb podmokłych, zbyt ciężkich, gliniastych lub zbyt lekkich, piaszczystych. Może rosnąć na każdej wystawie, od południowej do północnej. Najlepiej kwitnie na stanowiskach dobrze oświetlonych. Wymaga delikatnego cięcia wczesną wiosną, polegającego na wycinaniu zamarłych lub uszkodzonych pędów. Pozostałe pędy można przycinać dowolnie. W ogrodzie wymaga podpór złożonych z elementów o średnicy do 1 cm. Pięknie się prezentuje na siatkach, kratkach, drabinkach i linkach oraz na naturalnych podporach np. krzewach liściastych i iglastych.

autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

pochodzenie pierwsza publikacja: 1872 T. Moore & G. Jackman The Clematis as a Garden Flower;
odkrywca, hodowca (selekcjoner): I. Anderson-Henry w 1855 r. Wielka Brytania;
wprowadzenie do handlu: Peter Lawson & Son 1870 Wielka Brytania

grupa roślin pnącza

grupa użytkowa pnącza

forma	pnące
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	pnące
docelowa wysokość	od 3 m do 5 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	czerwiec
	lipiec
	sierpień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste
	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa próchniczna
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe
	pnące na ogrodzenia
	pnące na pergole, kraty
nagrody	AGM 1873, AGM 1993
strefa	4



autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

Producenci *Clematis* 'Henryi' w Polsce

CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa