


# *Clematis* 'Mrs Robert Brydon'

powojnik 'Mrs Robert Brydon'

Grupa *Heracleifolia*



(C) fot. Szczepan Marczyński



Bylinowa odmiana powstała ze skrzyżowania *Clematis virginiana* i *Clematis heracleifolia* var. *dauidiana*. Pędy płożą się po ziemi osiągając 1-2m rocznie. Liście duże trójdzielne, ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty małe, jasnofioletowe, z długimi białymi pręcikami. Kwitnie od lipca do września. Dobra roślina okrywowa. Półbylina.

autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

pochodzenie	pierwsza publikacja: R. Brydon 1939 Horticulture; odkrywca, hodowca (selekcjoner): R. Brydon USA; wprowadzenie do handlu: Wayside Gardens 1939
grupa roślin	pnącza
grupa użytkowa	pnącza
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	płożący
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan

barwa kwiatów	beżowe lila
pora kwitnienia	lipiec sierpień wrzesień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna roślina okrywowa rabaty
strefa	4



autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

## Producenci *Clematis* 'Mrs Robert Brydon' w Polsce

ŻUREK Antoni Gospodarstwo Szkółkarskie