


# Clematis 'William Kennett'

powojnik 'William Kennett'

Grupa Late Large-flowered (incl. Jackmanii & Lanuginosa)



(C) fot. Szczepan Marczyński



Jedna z najstarszych odmian, wyhodowana w Anglii w 1875 r. Kwiaty niebieskie z różowymi przebarwieniami. Pręciki ciemnoczerwone. Młode kwiaty mają lekko falowane brzegi działek. Można ciąć słabo (2) wtedy kwitnie V-VII lub ciąć silnie (3) wtedy kwitnie VII-X.

autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

pochodzenie	pierwsza publikacja: Moore 1875 Gardners' Chronicle 3; odkrywca, hodowca (selekcjoner): G.R. Jackman & Son Wielka Brytania; wprowadzenie do handlu: 1875
grupa roślin	pnącza
grupa użytkowa	pnącza
forma	pnącze
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	pnącze
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	niebieskie
pora kwitnienia	maj czerwiec lipiec
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeziębna ogrodowa próchnicza
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe pojemniki, balkony, tarasy pnącze na ogrodzenia pnącze na pergole, kraty
strefa	4



autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

## Producenci *Clematis* 'William Kennett' w Polsce

ŻUREK Antoni Gospodarstwo Szkółkarskie