

# *Achillea ageratifolia*

krwawnik żeniszkolistny

Synonim łaciński: *Achillea ageratifolia* subsp. *aizoon*

Niska bylina o srebrzystoszarym zabarwieniu liści. Tworzy zwarte poduszki o wysokości 10 - 20 cm, dekoracyjne także po okresie kwitnienia. Liście wąskolancetowate, długości do 6 cm, wąskie, o brzegach podwiniętych, grzebieniasto wyciętych, filcowato, biało owłosione, ułożone w rozetki. Kwiatostany koszyczkowate, białe, osadzone pojedynczo, o średnicy około 2,5 mm . Rozkwitają w VI - VII. Krwawnik ten należy sadzić w miejscach bardzo nasłonecznionych, na glebie z dodatkiem wapiennego żwiru, suchej lub lekko wilgotnej. Nadaje się do sadzenia w słonecznych partiach ogrodu skalnego.

autorzy opisu tekstowego: Jacek Marcinkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	środkowa część Półwyspu Bałkańskiego
pochodzenie	pierwsza publikacja: Sibth. et Sm. 1895
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	roślina wolnorosnąca
pokrój	poduszkowaty
docelowa wysokość	od 0,1 m do 0,2 m
barwa liści (igieł)	szare, niebieskawe, srebrzyste
zimozieloność liści (igieł)	liście półzimozielone
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	czerwiec lipiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże suche podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn zasadowy
rodzaj gleby	piaszczysta przeciętna ogrodowa gliniasta

walory	ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody przydomowe ogrody skalne ogrody wrzosowiskowe kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) w grupach
strefa	6

autorzy opisu tabelarycznego: Jacek Marcinkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

## **Producenci *Achillea ageratifolia* w Polsce**

BARCIKOWSCY Włodzisław Barcikowski, Izabela Ławicka Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów

DĘBSCY Agnieszka i Piotr Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne

HORTULUS Piotr Bigoński Gospodarstwo Rolne Szkółka Roślin Ozdobnych

