

Iris pumila

kosaciec niski

Synonim łaciński: *Iris attica*



(C) fot. Wiesław Szudło



Nazwa zbiorowa dla grupy odmian mieszańcowych, zwanych inaczej Iris gr. Barbata Nana. Karłowe kosańce bródkowe dorastają do wysokości 25 cm, na pędzie mają 1-2 kwiaty, kwitną w kwietniu i maju. Tworzą nieduże, grube kłaczka, płytko zakorzenione, z których wyrastają szablaste, zielononiebieskawe liście. Odmiany bardzo liczne, ale rzadko w produkcji, tylko w kolekcjach, najczęściej spotykane formy o kwiatach żółtych, niebieskich lub fioletowych. Wymagają stanowiska słonecznego i bardzo przepuszczalnej gleby. Należy stosować w ogrodach skalnych w małych grupach po 3-10 lub 10-20 razem. Liczba roślin na 1 m² - 12.

autorzy opisu tekstowego: Jacek Marcinkowski; Agencja Promocji Zieleni APZ

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,1 m do 0,2 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	purpurowofioletowe fioletowe
pora kwitnienia	kwiecień maj
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa
walory	ozdobne z kwiatów ogrody przydomowe
zastosowanie	ogrody skalne rabaty w grupach
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Iris pumila* w Polsce

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów
DĄBROWSKY Olga i Marcin Szkółka Bylin
TEPPER Elżbieta i Janusz Gospodarstwo Ogrodnicze