

Iris sibirica 'Cambridge'

kosaciec syberyjski 'Cambridge'




Kępiasta bylina dekoracyjna ze względu na ciemnozielone, trawiaste liście oraz pojedyncze lazurowoniebieskie kwiaty. Tworzy gęste kępy dorastające do wysokości około 90 cm. Liście są ciemnozielone, trawiaste, bardzo wąskie o szerokości poniżej 1 cm i długości około 60-70 cm, łukowato wygięte. Wyrastają z krótkich, podziemnych kłaczy. W maju ukazują się okrągłe w przekroju pędy kwiatostanowe wyrastające ponad liście i zakończone 2-5 kwiatami. U tej odmiany są pojedyncze, lazurowoniebieskie z nieco ciemniejszym, siatkowatym żyłkowaniem. Mają po 6 działek kielicha. Trzy są szerokie i odwinęte do dołu, z biało-żółtymi plamami u nasady, tzw. strzałkami wskazującymi miejsce do lądowania owadom zapylającym. Trzy pozostałe są węższe i wzniesione. Po przekwitnięciu rośliny tworzą dekoracyjne torebki nasienne, początkowo zielone, później brązowiejące. Bylina łatwa w uprawie, najlepiej rośnie na stanowiskach stale wilgotnych, na glebach żyznych, torfowych, próchnicznych, o lekko kwaśnym pH. Preferuje miejsca słoneczne do lekko ocienionych. W cieniu słabo kwitnie i tworzy więcej liści. Co roku wiosną należy obcinać zaschnięte liście, a co kilka lat dzielić i rozsadzać kępy, aby odmłodzić rośliny i podtrzymać obfite kwitnienie. Bylina odporna na mróz i zdrowa. Przydatna do sadzenia na rabatach bylinowych, w kompozycjach naturalistycznych i rustykalnych. Dobrze rośnie nad brzegami zbiorników wodnych, oczek i strumieni. Kwiaty i torebki nasienne można ścinać do wazonów.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Marjorie Brummitt Wielka Brytania; wprowadzenie do handlu: 1964
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan pojedyncze
barwa kwiatów	niebieskie
pora kwitnienia	maj

nastonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże podmokłe (bagienne, nadwodne, wodne) podłoże wilgotne podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	próchnicza przeziębna ogrodowa
walory	roślina wabiąca owady zapylające ozdobne z liści/igieł ozdobne z kwiatów ciekawy pokrój
zastosowanie	ogrody osiedlowe w grupach suche bukiety kwiaty cięte rabaty kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) ogrody wodne i bagienne ogrody orientalne zieleń publiczna ogrody przydomowe
nagrody	Award of Garden Merit (AGM), nagroda przyznawana przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze (RHS) wartościowym roślinom ogrodowym 1993
strefa	4



autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Iris sibirica* 'Cambridge' w Polsce

BARCIKOWSCY Włodzisław Barcikowski, Izabela Ławicka Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów
TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin
ULIŃSCY Szkółkarstwo Ozdobne