

Aesculus hippocastanum 'Memmingeri'

kasztanowiec biały 'Memmingeri'



Kasztanowiec o oryginalnie zabarwionych liściach i szerokiej, malowniczej koronie. Starsze egzemplarze mają gałęzie przewieszające się do samej ziemi. Wzrost wolniejszy niż gatunku. Liście pięciopalczaste, złożone z 5 do 7 wydłużonych, odwrotnie jajowatych listków, na wiosnę najpierw żółtawe, później biało oprószone, latem jasnozielonkawe. Duże pąki wydzielają lepłą substancję. Kwiaty białe zebrane w okazałe kwiatostany, do 40 cm długości, miododajne, V. Owoce – liczne kasztany. Stanowiska słoneczne i cieniste. Wybarwienie bardziej intensywne w miejscach słonecznych, ale tam liście mogą być przypalane. Małe wymagania glebowe, ale najlepiej rośnie na glebie próchnicznej, ilastej, zasobnej. Duża odporność na warunki miejskie. Odmiana kolekcjonerska. Mocny, jasny akcent kolorystyczny w ogrodzie.

autorzy opisu tekstowego: TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin Gabriel Tomżyński

pochodzenie	pierwsza publikacja: (K. Koch) Schelle jako Aesculus hippocastanum forma memmingeri (K.Koch) (1955); odkrywca, hodowca (selekcjoner): nieznany, <1955 w Europie
grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste drzewa
forma	drzewo
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	drzewiasty rozłożysty
	jajowaty przewisający (płaczący, zwisty)
docelowa wysokość	powyżej 20

barwa liści (igieł)	żółte, złociste
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	maj
owoce	brązowe kuliste
pora owocowania	wrzesień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa próchnicza roślina tolerancyjna
walory	ozdobne z liści/igieł roślina miododajna
zastosowanie	parki zadrzewienia krajobrazowe zieleń publiczna drzewo alejowe parkowe kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
strefa	4



autor opisu tabelarycznego: Gabriel Tomżyński, TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin;