


# *Ampelopsis bodinieri*

winnik Bodiniera



(C) fot. Szczepan Marczyński



Pnącze o średnio silnym wzroście. Liście sztywne, zielone, lekko błyszczące na górnej stronie, pojedyncze, 5-10 cm długości i szerokości, grubo ząbkowane, z 3-5 słabo wykształconymi kłapami, z czerwonymi ogonkami liściowymi. Podobne do liści płatanu. Szczególnie przydatne do sadzenia przy altanach, pergolach i różnych podporach ogrodowych.

autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

zasięg geograficzny	Chiny
pochodzenie	pierwsza publikacja: Augustin Abel Hector Léveillé i Eugène Vaniot 1934 Rehder, J. Arnold Arbor. 15: 23. 1934.
grupa roślin	pnącza
grupa użytkowa	pnącza
forma	pnącze
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	pnącze
docelowa wysokość	od 3 m do 5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone

zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę

owoce	fioletowe kuliste
pora owocowania	październik
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa
walory	ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody przydomowe pojemniki, balkony, tarasy pnącze na ogrodzenia pnącze na pergole, kraty pnącze na ściany
strefa	5b

autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

