

# *Pennisetum alopecuroides* 'Moudry'

rozplenica japońska 'Moudry'



Kępkowa trawa bylinowa o wysokości 60-75 cm. Szczególnie atrakcyjna w czasie kwitnienia – od sierpnia do końca okresu wegetacji pojawiają się puszyste kwiatostany, które przypominają wąskie szczotki do butelek. Ich kolor jest wyjątkowy – ciemnopurpurowy („czarny”), zmieniający się w brązowy w miarę dojrzewania kwiatostanu. Liście są wąskie, zielone, jesienią przebarwiają się na żółto, a następnie na beżowo. Trawa ta preferuje stanowisko słoneczne albo tylko lekko zacienione. Najlepiej rośnie w żyznej, ale przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Wymaga ciepłych, osłoniętych miejsc oraz okrycia przed zimą. Nadaje się na rabaty (najlepiej wygląda w grupach), obwódki, do ogrodów tworzonych z samych traw, do pojemników tarasowych. Polecana także na kwiaty cięte i na suche bukiety.

autorzy opisu tekstowego: Alicja Cecot; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin

byliny

forma

bylina

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku



pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	purpurowe
pora kwitnienia	sierpień wrzesień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	próchnicza
walory	ciekawy pokrój ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł  ogrody przydomowe kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty
zastosowanie	pojemniki, balkony, tarasy kwiaty cięte suche bukiety w grupach soliter (pojedynczo)
strefa	7b

autorzy opisu tabelarycznego: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

