

Ranunculus acris

jaskier ostry

Synonim łaciński: *Ranunculus stevenii*

Gatunek kosmopolityczny, spotykany na wilgotnych łąkach w całej Polsce. Osiąga wysokość od 30 do 90 cm, im miejsce wilgotniejsze, tym jaskry wyższe. Nie rozrasta się szybko, bo ma raczej krótkie kłącza, za to rozsiewa się z łatwością dzięki dużej ilości nasion. Łodygi rozgałęzione. Liście odziomkowe na długich ogonkach, pocięte na wąskie łatki. Liście na łodygach mniej liczne. Kwiaty żółte, miseczkowate, w zarysie okrągłe, średnicy do 2,5 cm, o płatkach jedwabście połyskliwych. Kwitnie w najobficiej w maju, potem sporadycznie w ciągu całego lata. Wymaga stanowisk słonecznych i stale wilgotnej gleby, poza tym jest rośliną nie wymagającą specjalnej uwagi. Nie bywa narażony na atak chorób i szkodników roślinnych. Jest w pełni zimotrwały. Nadaje się na łąki kwietne w miejscach wilgotnych, gdzie może się swobodnie rozsiewać. W ogrodach sadzona bywa jedynie odmiana pełnokwiatowa 'Multiplex'. Ostrzeżenie: jaskier ostry jest rośliną trującą.

autorzy opisu tekstowego: Jacek Marcinkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Europa, Azja, Ameryka Północna
pochodzenie	pierwsza publikacja: Linneusz 1753
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	żółte
pora kwitnienia	maj czerwiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże wilgotne podłoże podmokłe (bagienne, nadwodne, wodne)
ph podłoża	roślina tolerancyjna

rodzaj gleby	przeziębna ogrodowa próchnicza
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe parki kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Jacek Marcinkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Ranunculus acris* w Polsce

HORTULUS Piotr Bigoński Gospodarstwo Rolne Szkółka Roślin Ozdobnych

