


# *Rheum palmatum* var. *tanguticum*

rabarbar dłoniasty podgatunek. tangucki



(C) fot. Wiesław Szydło



Okazała bylina o dużych liściach. Liście w zarysie okrągłosercowate, głęboko dłoniasto klapowane, o klapach spiczastych i głęboko pierzasto wcinanych. Młode liście intensywniej czerwone. Kwiatostany na pędach wysokości do 2 m, wąskie, wiechowate, z żółtobiałymi kwiatami, w V-VI. Owoce ciemnoczerwone. Wymaga obfitego nawożenia i dość wilgotnej gleby. W miejscach jałowych, szczególnie podczas suchego lata, liście zasychają już w VIII. Poleca się dość wcześnie wycinać przekwitające kwiatostany dzięki czemu ulistnienie jest trwalsze. Po 5-6 latach konieczne jest przesadzanie, gdyż słabnie siła wzrostu. Najefektowniej wygląda sadzony w ogrodzie żwirowym. Do sadzenia pojedynczo lub 2-3 w grupie. Liczba roślin na 1 m<sup>2</sup> - 1.

autorzy opisu tekstowego: Jacek Marcinkowski; Agencja Promocji Zieleni APZ

grupa roślin

byliny

grupa użytkowa

byliny

## **Producenci *Rheum palmatum* var. *tanguticum* w Polsce**

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów  
DĄBROWSCY Olga i Marcin Szkółka Bylin  
OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkółka Bylin  
SZMIT Szkółka