

# *Sempervivum arachnoideum* subsp. *tomentosum*

rojnik pajęczynowaty podg. kutnerowaty

Synonim łaciński: *Sempervivum laggeri*

Bylina tworząca małe, płaskokuliste rozety, pokryte pajęczynowatymi włoskami. Ta odmiana ma drobniejsze rozety, o bardziej kulistym kształcie, a liście pokryte gęściej włoskami. Kwiaty czerwonoróżowe w zebrane w kwiatostany, na wysokich pędach, do 12 cm, w VII. Wymaga gleby piaszczystej, suchej i miejsc bardzo nasłonecznionych. Nadaje się do ogrodu skalnego i do zazieleniania dachów. Do sadzenia w małych grupach po 3-10 razem. Liczba roślin na 1 m<sup>2</sup> - 16.

autorzy opisu tekstowego: Jacek Marcinkowski; Agencja Promocji Zieleni APZ

grupa roślin

grupa użytkowa

sukulenty

strefa

5

## **Producenci *Sempervivum arachnoideum* subsp. *tomentosum* w Polsce**

BARCIKOWSCY Włodzisław Barcikowski, Izabela Ławicka Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów

DĄBROWSCY Olga i Marcin Szkółka Bylin

DĘBSKI Krzysztof Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie

