

# *Solidago* 'Strahlenkrone'

nawłoc 'Strahlenkrone'

Synonim łaciński: *Solidago* 'Crown of Rays'



(C) fot. Grzegorz Falkowski



Średniej wysokości bylina rabatowa o bardzo regularnym pokroju. Pędy wyprostowane, nierozgałęzione, sztywne, gęsto ulistnione. Dorasta do 60 cm wysokości. Jest o wiele niższa niż nawłoc kanadyjska, spontanicznie rozsiewająca się na łąkach i nieużytkach. Liście wąskolancetowate, ząbkowane, zielone, równomiernie wyrastające na całej długości pędu, aż po kwiatostan. Koszyczki kwiatowe żółte, drobne, ułożone bardzo gęsto w kwiatostanie. Kwiatostany regularnie stożkowate, gęste, nie przewieszające się. Pojawiają się na wierzchołkach pędów na przełomie lipca i sierpnia. Nawłocie nie mają szczególnych wymagań glebowych, są całkowicie zimotrwałe. Dobrze rosną na każdej glebie umiarkowanie wilgotnej, na stanowiskach słonecznych.. Zagrożeniem może być mączniak prawdziwy, choroba grzybowa objawiająca się mączystym nalotem na liściach. Bardziej narażone na chorobę są nawłocie rosnące w miejscach zacienionych. Znajduje zastosowanie na rabatach. Sadzi się ją wśród niższych bylin, tak aby wyeksponować regularny pokrój. Kwiatostany tej odmiany nadają się do zasuszania i wykorzystania w zimowych kompozycjach z suchych roślin. Warunkiem powodzenia jest dość wczesne ścięcie, zanim pierwsze koszyczki przekwitną i zaczną się ukazywać puszyste nasiona. Wczesne ścinanie kwiatostanów nie dopuszcza także do rozsiewania się nasion i pojawiania siewek powstałych ze skrzyżowania z dzikim nawłociami, wysokimi, o rozpięchłych kwiatostanach. W ogrodzie naturalistycznym, na kwiatnych łąkach można pozwolić na samosiewy, ale należy proces ściśle kontrolować, bo nawłocie mają predyspozycje do inwazyjności. Dobrze ogranicza występowanie nawłoci koszenie łąki w lipcu, wtedy opóźnia się powstawanie kwiatostanów, a kwiaty jeśli powstaną, z pewnością nie wydadzą nasion. Ilość roślin na 1 m<sup>2</sup> – 5 sztuk.

autorzy opisu tekstowego: Jacek Marcinkowski; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Karl Foerster Niemcy; wprowadzenie do handlu: Benary 1951 Niemcy
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	roślina wolnorosnąca
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	żółte
pora kwitnienia	sierpień wrzesień październik
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	roślina tolerancyjna
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeziębna ogrodowa
walory	ciekawy pokrój ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe zieleń publiczna kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty pojemniki, balkony, tarasy
strefa	3



autorzy opisu tabelarycznego: Jacek Marcinkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

# Producenci *Solidago* 'Strahlenkrone' w Polsce

MARCINKOWSCY J.J. Byliny w Pojemnikach

