

Taxodium distichum 'Nutans'

cypryśnik błotny 'Nutans'

Synonim łaciński: *Taxodium distichum* 'Pendula'



(C) fot. Grzegorz Falkowski



Bardzo stara odmiana notowana na terenie Niemiec już w 1789 roku! Tworząca dosyć wolno rosnące drzewa osiagające do 15 m wysokości o wąskich kolumnowych koronach. Pędy krótkie ustawione horyzontalnie, cienkie i poskręcane, pokryte bardzo krótkimi igłami (0,5 cm) ustawionymi pionowo. Igły jasnozielone, jesienią rudziejące i opadające na zimę wraz z drobnymi pędami. Rośliny w uprawie preferują gleby stale wilgotne a nawet mokre. Stanowisko do uprawy powinno być osłonięte, słoneczne. Podczas surowych zim szczególnie młode rośliny mogą przemarzać. Ciekawe drzewo polecane do sadzenia w dużych ogrodach i parkach w pobliżu cieków i zbiorników wodnych.

autorzy opisu tekstowego: Wiesław Szydło; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	wprowadzenie do handlu: przed 1926
grupa roślin	iglaste
grupa użytkowa	iglaste
forma	drzewo
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kolumnowy
docelowa wysokość	od 10 m do 15 m
zimozieloność liści (igieł)	igły opadające na zimę

nastłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże wilgotne podłoże podmokłe (bagienne, nadwodne, wodne)
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa
walory	ciekawy pokrój ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	parki ogrody orientalne ogrody wodne i bagienne soliter (pojedynczo)
strefa	6b

autorzy opisu tabelarycznego: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Taxodium distichum* 'Nutans' w Polsce

BÓR Szkołka Drzew i Krzewów Ozdobnych
ZDUNEK Szkołka

