

Acer barbinerve

klon bródkowaty

Gatunek dalekowschodni, występujący w Chinach i Mandżurii. Małych rozmiarów drzewo, dorastające do 12 m wysokości. Kora gładka, ciemnoszara. Młode, jednoroczne pędy czerwone; starsze zielone. Liście do 10 cm długości, pięcioklapowe, przy czym trzy wierzchołkowe kłapy są większe, a dwie u nasady liści słabiej zarysowane. Brzeg blaszki grubo podwójnie piłkowany. Kwiaty żeńskie zebrane w grona. Owoce skrzydlaki, do 3,5cm długości, połączone ze sobą pod kątem rozwartym. Przeciętne wymagania glebowe. Dekoracyjny wiosną (wcześnie się rozwija) i jesienią (ładnie przebarwiają się na żółto liście). Polecany do większych ogrodów, zieleni na osiedlach, kolekcji.

autorzy opisu tekstowego: Adam Marosz; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Chiny, Mandżuria, Korea,
grupa roślin	liściaste
grupa użytkowa	liściaste drzewa
forma	drzewo
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	drzewiasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 10 m do 15 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	żółte
pora kwitnienia	kwiecień maj
owoce	skrzydlaki
pora owocowania	sierpień wrzesień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa gliniasta

walory	ciekawy pokrój ładne jesienne zabarwienie ozdobne pędy
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
strefa	5a

autorzy opisu tabelarycznego: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Acer barbinerve* w Polsce

SZMIT Szkółka

