

Acer barbinerve

klon bródkowaty

Gatunek dalekowschodni, występujący w Chinach i Mandżurii. Małych rozmiarów drzewo, dorastające do 12 m wysokości. Kora gładka, ciemnoszara. Młode, jednoroczne pędy czerwone; starsze zielone. Liście do 10 cm długości, pięcioklapowe, przy czym trzy wierzchołkowe kłapy są większe, a dwie u nasady liści słabiej zarysowane. Brzeg blaszki grubo podwójnie piłkowany. Kwiaty żeńskie zebrane w grona. Owoce skrzydlaki, do 3,5cm długości, połączone ze sobą pod kątem rozwartym. Przeciętne wymagania glebowe. Dekoracyjny wiosną (wcześnie się rozwija) i jesienią (ładnie przebarwiają się na żółto liście). Polecany do większych ogrodów, zieleni na osiedlach, kolekcji.

autorzy opisu tekstowego: Adam Marosz; Związek Szkółkarzy Polskich

| | |
|-----------------------------|--|
| zasięg geograficzny | Chiny, Mandżuria, Korea, |
| grupa roślin | liściaste |
| grupa użytkowa | liściaste drzewa |
| forma | drzewo |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | drzewiasty wyprostowany |
| docelowa wysokość | od 10 m do 15 m |
| barwa liści (igieł) | jasnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze |
| barwa kwiatów | żółte |
| pora kwitnienia | kwiecień maj |
| owoce | skrzydlaki |
| pora owocowania | sierpień wrzesień |
| nasłonecznienie | stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
| rodzaj gleby | przeciętna ogrodowa gliniasta |

| | |
|--------------|---|
| walory | ciekawy pokrój ładne jesienne zabarwienie ozdobne pędy |
| zastosowanie | ogrody przydomowe parki zieleń publiczna kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) |
| strefa | 5a |

autorzy opisu tabelarycznego: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Acer barbinerve* w Polsce

SZMIT Szkółka

