

Astrantia 'Hadspen Blood'

jarzmianka 'Hadspen Blood'

Synonim łaciński: *Astrantia major* 'Hadspen Blood'

Niska bylina, dorastająca do 40 cm wysokości, szczególnie efektowna w czasie kwitnienia. Liście odziomkowe głęboko dłoniastodzielne, o odcinkach odwrotnie jajowatych, ząbkowanych. Kwiaty różowopurpurowe, zebrane w bardzo ozdobne, szczytowe kwiatostany z charakterystycznymi zaostrzonymi pokrywami (listki u podstawy baldacha) dłuższymi od kwiatostanów. Kwiaty pojawiają się od czerwca do sierpnia. Bylina w pełni mrozoodporna. Najlepiej rośnie na wilgotnych, przepuszczalnych, zasobnych w próchnicę, zwykle wapiennych glebach i na półcienistych stanowiskach. Polecana do sadzenia w ogrodach skalnych i na cienistych rabatach, w założeniach naturalistycznych, do sadzenia w grupach po 20 roślin i więcej. Nadaje się także na kwiat cięty.

autorzy opisu tekstowego: Małgorzata Kunka; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	purpurowe
pora kwitnienia	czerwiec lipiec sierpień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże wilgotne
ph podłoża	odczyn zasadowy
rodzaj gleby	próchniczna
walory	ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł

	ogrody przydomowe
	kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
zastosowanie	rabaty
	kwiaty cięte
	w grupach
strefa	5

autorzy opisu tabelarycznego: Małgorzata Kunka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

