

# Hosta 'Spilt Milk'

funkia 'Spilt Milk'



(C) fot. Grzegorz Falkowski



Średniej wielkości funkia zaliczana do grupy Streaked, charakteryzująca się występowaniem smug lub prążków na fragmentach lub całej powierzchni liści. Odmiana mieszańcowa uzyskana w 1999 r. przez Mildred Seaver z wykorzystaniem odmiany 'Tokudama'. Kępiasta bylina dorastająca do 0,6 m wysokości oraz 1,2 m szerokości. Blaszki liściowe duże, eliptyczne, na wierzchołkach zastrzone, u podstawy sercowate, mają do 25 cm długości i 20 cm szerokości, niebieskozielone, z charakterystycznymi naciekami, przypominającymi wąskie strużki rozlanego mleka. Ponadto na powierzchni blaszek liściowych miejscami pojawiają się jaśniejsze, szarawe smugi. Kwiaty prawie białe, zebrane w groniaste kwiatostany na łodygach dorastających do 75 cm wysokości. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Roślina polecana do sadzenia na glebach żyznych, próchnicznych, umiarkowanie wilgotnych, przepuszczalnych, na stanowiskach cienistych. Odmiana kolekcjonerska, bardzo wolno przyrasta, polecana do sadzenia na rabatach oraz uprawy w pojemnikach.

autorzy opisu tekstowego: Wiesław Szydło; Związek Szkółkarzy Polskich

|                |   |
|----------------|---|
| pochodzenie    | odkrywca, hodowca (selekcjoner): Mildred Seaver USA; wprowadzenie do handlu: 1999 |
| grupa roślin   | byliny  |
| grupa użytkowa | byliny  |
| forma          | bylina  |
| siła wzrostu   | wzrost typowy dla gatunku   |
| pokrój         | kępiasty  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| docelowa wysokość           | od 0,5 m do 1 m   |
| barwa liści (igieł)         | wielobarwne, pstre lub obrzeżone<br>szare, niebieskawe, srebrzyste  |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę  |
| rodzaj kwiatów              | pojedyncze<br>kwiatostan  |
| barwa kwiatów               | białe   |
| pora kwitnienia             | czerwiec<br>lipiec  |
| nasłonecznienie             | stanowisko półcieniste  |
| wilgotność                  | podłoże umiarkowanie wilgotne   |
| ph podłoża                  | odczyn lekko kwaśny do obojętnego   |
| rodzaj gleby                | przeiętna ogrodowa<br>próchniczna   |
| walory                      | ozdobne z liści/igieł   |
| zastosowanie                | ogrody przydomowe<br>roślina okrywowa<br>kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)<br>rabaty<br>pojemniki, balkony, tarasy<br>w grupach |
| strefa                      | 4   |



autorzy opisu tabelarycznego: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;

## Producenci *Hosta* 'Spilt Milk' w Polsce

BARCIKOWSCY Elżbieta i Włodzisław Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów  
OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkółka Bylin