

Echinacea purpurea 'Cranberry Cupcake'

jeżówka purpurowa 'Cranberry Cupcake'

Synonim łaciński: *Echinacea* 'Cranberry Cupcake'

Nowa, żywotna odmiana jeżówki wprowadzona na rynek ogrodnicy w 2011 roku, reklamowana jako ulepszona odmiana 'Razzmatazz'. Charakteryzuje się kompaktowym wzrostem. Osiąga zaledwie 35-45 cm wysokości i 50-55 cm średnicy. Wiosną tworzy rozety z intensywnie zielonych liści. Liście jajowatolancetowate, długości ok. 10 cm, spiczasto zaostrome, o ząbkowanych brzegach, osadzone na długich ogonkach. Zarówno liście jak i pędy pokryte są krótkimi, szorstkimi włoskami. Latem ponad rozetę wyrastają sztywne, wzniesione pędy kwiatostanowe, na końcach których, od połowy czerwca do września, pojawiają się oryginalne, pełne kwiatostany typu anemonowego. Są to koszyczki kwiatowe 7,5-10 cm średnicy, składające się ze skierowanego w dół pojedynczego okółka różowych kwiatów języczkowatych i bardzo dużego, wypukłego środka w kształcie pomponu, zbudowanego z licznych kwiatów rurkowatych, w kolorze żurawinowym (stąd nazwa 'Cranberry Cupcake'). Efektowne kwiaty charakteryzują się delikatnym zapachem, wabiącym motyle i pszczoły. Rośliny preferują stanowiska słoneczne, gleby żyzne, próchniczne, umiarkowanie wilgotne, dobrze zdrenowane, o odczynie obojętnym. Łatwo adaptują się do różnorodnych warunków ogrodnicy. Mogą rosnąć w lekkim półcieniu, na przeciętnych, a nawet słabych glebach ogrodnicy. Wymagane jest wówczas systematyczne nawożenie. Tolerancyjne co do kwasowości podłoża, nie znoszą jedynie podłoża zbyt kwaśnych. Idealne pH mieści się w granicach 5.8-7.3. Dobrze znoszą suszę i upały, radzą sobie z zanieczyszczonym powietrzem. Odporne na mróz. Przycinanie przekwitłych kwiatostanów nie tylko poprawia ogólny wygląd roślin, ale także pobudza je do intensywniejszego kwitnienia. Po kilku latach, gdy rośliny silnie się zagęszczą i słabiej kwitną, należy podzielić ich kępy i rozsadzić na nowe miejsce. Typowa bylina rabatowa, zwłaszcza na słoneczne stanowiska w ogrodzie. Pięknie prezentuje się sadzona w grupach na rabatach, w towarzystwie traw ozdobnych lub innych kwitnących w tym czasie bylin - żółto kwitnących rudbekii, języczek oraz niebieskich i fioletowych szalwii i przetaczników. Sprawdza się doskonale zarówno w ogrodach naturalistycznych jak i nowoczesnych. Ze względu na zwarty kompaktowy pokrój i obfite kwitnienie jest cenną rośliną pojemnikową. Nadaje się na kwiat cięty, długo utrzymuje świeżość w wazonie. Kwiaty można suszyć do wykorzystania w jesiennych kompozycjach.

autorzy opisu tekstowego: Ewa Chojnowska; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	wprowadzenie do handlu: Terra Nova Nurseries, Inc. 2011 Canby, Oregon, USA
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	roślina wolnorosnąca
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	czerwone różowe
pora kwitnienia	czerwiec lipiec sierpień
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże suche podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego odczyn zasadowy
rodzaj gleby	roślina tolerancyjna
walory	ciekawy pokrój odporność na zanieczyszczenia pachnące kwiaty ozdobne z kwiatów roślina miododajna
zastosowanie	ogrody przydomowe ogrody skalne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty pojemniki, balkony, tarasy kwiaty cięte suche bukiety w grupach soliter (pojedynczo)
strefa	4



autorzy opisu tabelarycznego: Ewa Chojnowska; , Związek Szkółkarzy Polskich;