

Aquilegia vulgaris 'Ruby Port'

orlik pospolity 'Ruby Port'

Krótkowieczna, kępiasta bylina o atrakcyjnych, niepospolitych kwiatach, które licznie pojawiają się późną wiosną, są pełne i mają wyjątkową, bordową barwę. Są też pozbawione ostrogi, która charakteryzuje kwiaty większości orlików (choć u gatunku *Aquilegia vulgaris* jest z reguły krótka). Brunatnobordowe są również młode liście o typowej dla gatunku budowie, które później, w trakcie rozwoju, stają się sinozielone. Odmiana 'Ruby Port', która jest rozmnażana z nasion, wywodzi się z początków siedemnastego wieku. Rośliny osiągają około 30-35 cm szerokości oraz 70-80 cm wysokości (w okresie kwitnienia), tworzą po kilka sztywnych pędów kwiatostanowych. Poszczególne kwiaty osadzone są na długich, zwisających szypułkach. Kwitnienie trwa od końca maja do początku lipca. Można je przedłużyć usuwając przekwitłe pędy. Z kolei utrzymywanie stałej wilgotności gleby przedłuża wegetację i opóźnia typowe dla orlików zanikanie roślin w drugiej połowie lata. Wymagają one półcienistego stanowiska i umiarkowanie wilgotnej, przepuszczalnej, niezbyt ciężkiej gleby – najlepiej żyznej, ale nieprzenawożonej azotem. Źle znoszą dzielenie i przesadzanie. Bywają atakowane przez specyficzne dla orlików szkodniki, jak miniarka orlikówka (*Phytomyza aquilegiae*) czy pęcznica orlikowa (*Pristiphora aquilegiae*), które żerując na liściach mogą powodować gołozę, ale także przez mszyce. Z chorób daje się we znaki mączniak, przede wszystkim prawdziwy (*Erysiphe aquilegiae*), lecz coraz częściej w Europie notowany jest w wilgotnych latach także mączniak rzekomy orlika (*Peronospora aquilegiicola*). Rośliny są miododajne. Polecane są do sadzenia w niewielkich grupach: na rabatach bylinowych – lecz nie na ich pierwszym planie, ponadto w ogrodach wiejskich i naturalistycznych. Nadają się na kwiaty cięte.

autorzy opisu tekstowego: Alicja Cecot; Związek Szkółkarzy Polskich



grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	szare, niebieskawe, srebrzyste
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pełne kwiatostan
barwa kwiatów	bordowe
pora kwitnienia	maj czerwiec lipiec
nastłonecznienie	stanowisko półcieniste

wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	próchniczna
walory	ozdobne z kwiatów roślina miododajna
zastosowanie	ogrody przydomowe kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty kwiaty cięte w grupach
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Aquilegia vulgaris* 'Ruby Port' w Polsce

CYRZAN Szkołki Drzew i Krzewów Ozdobnych

DĄBROWSCY Olga i Marcin Szkołka Bylin

ZIELONE WZGÓRZE Szkołka Roślin Ozdobnych Anna Wójcik-Kager

