

Lonicera caerulea 'Brązowa'

jagoda kamczacka 'Brązowa'

Synonim łaciński: *Lonicera kamtschatica*

Krzew liściasty uprawiany dla wczesnie dojrzewających i jednych z pierwszych w sezonie owoców. Dorasta do 1,8-2 m wysokości i podobnej szerokości. Liście są zmienne w kształcie, owalne, zielone, od spodu niebieskawe, młode liście są miętko owłosione. Kwiaty wargowe, żółtokremowe, niepozorne, rozwijają się w pierwszej połowie kwietnia, są wytrzymałe na wiosenne przymrozki. Roślina obcopolna, do obfitego owocowania wymaga sąsiedztwa innych krzewów (odmian) jagody kamczackiej. Owocowanie rozpoczyna się już w 2 lub 3 roku po posadzeniu, pełnia owocowania następuje w 5 roku po posadzeniu, a z jednego krzewu średnio zbiera się od 3 do 4 kg owoców. Owoce są wydłużone, cylindryczne, ich skórka jest granatowa, pokryta srebrzystym, woskowym nalotem. W smaku są słodko-kwaśne, bogate w antocyjany, witaminy, makro i mikroelementy, korzystnie wpływające na zdrowie. Nadają się do spożywania na surowo oraz przetwarzania - wyrobu soków, wina, dżemów, suszenia i mrożenia. Krzewy łatwe w uprawie, tolerują gleby piaszczyste i suche, choć najlepiej rosną na podłożach lekko kwaśnych, umiarkowanie wilgotnych, piaszczysto-gliniastych, na stanowiskach słonecznych do półcienistych. Są w pełni odporne na mróz. Czasami liście mogą być porażane przez mączniaka prawdziwego, co objawia się występowaniem białych, mączystych plam na ich powierzchni.

autorzy opisu tekstowego: Wiesław Szydło; Związek Szkółkarzy Polskich

| | |
|-----------------------------|--|
| pochodzenie | polska odmiana odkrywca, hodowca (selekcjoner): Zygmunt Landowski Polska; wprowadzenie do handlu: Szkołka 'Jagódka', Lębork |
| grupa roślin | owocowe |
| grupa użytkowa | krzewy owocowe |
| forma | krzew |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | krzewiasty rozłożysty |
| docelowa wysokość | od 1 m do 2 m |
| barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | pojedyncze |
| barwa kwiatów | kremowe żółte |
| pora kwitnienia | kwiecień |
| owoce | niebieskie granatowe jadalne |

| | |
|------------------|--|
| pora owocowania | maj czerwiec |
| nastłonecznienie | stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże suche podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn lekko kwaśny do obojętnego |
| rodzaj gleby | piaszczysta przeiętna ogrodowa próchniczna |
| walory | jadalne owoce roślina miododajna |
| zastosowanie | owoce deserowe owoce na przetwory owoce mrożone owoce na soki owoce na wino, nalewki |
| strefa | 3 |



autorzy opisu tabelarycznego: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Lonicera caerulea* 'Brązowa' w Polsce

MILCZYŃSKI Maciej i Mateusz Szkółka Krzewów Ozdobnych