

# *Amsonia tabernaemontana*

amsonia nadreńska



(C) fot. Grzegorz Falkowski




Mało jeszcze znany gatunek bylinowy, pochodzący z USA, tworzący kępiaste formy złożone z wzniesionych pędów dorastających zwykle do 50 cm (czasami nawet 100 cm) wysokości. Liście są wąskie, lancetowate i dorastają do kilkunastu centymetrów długości. Kwiaty są jasnoniebieskie, lejkowate, na końcu szeroko otwarte (przypominają małe gwiazdki), osiągają do 18 mm średnicy. Kwiaty są zebrane na szczytach pędów w luźne kwiatostany. Kwitnienie tego gatunku przypada na czerwiec i lipiec. Amsonie to trwałe i długowieczne byliny. Do właściwego wzrostu wymagają żyznych i stale umiarkowanie wilgotnych gleb. Stanowisko do ich uprawy powinno być słoneczne lub lekko ocienione. Są roślinami o dobrej mrozoodporności. Ładnie komponują się w nasadzeniach naturalistycznych i łąkowych, szczególnie w połączeniu z trawami.

autorzy opisu tekstowego: Wiesław Szydło; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Ameryka Północna
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m od 0,5 m do 1 m

barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	niebieskie
pora kwitnienia	czerwiec lipiec
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	próchniczna gliniasta
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe rabaty w grupach
strefa	5



autorzy opisu tabelarycznego: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;

## **Producenci *Amsonia tabernaemontana* w Polsce**

OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkołka Bylin