

Astrantia 'Buckland'

jarzmianka 'Buckland'

Synonim łaciński: *Astrantia major* 'Buckland'



(C) fot. Gabriel Tomżyński



Bylina ozdobna z jasnoróżowych kwiatów, podkreślonych przez ciemnozielone liście. W czasie kwitnienia jej kępy dorastają do 60 cm wysokości przy około 40 cm średnicy. Liście odziomkowe są głęboko podzielone, dłoniaste, osadzone na długich ogonkach, zielone. Na zimę liście zasychają. Kwiaty, a w rzeczywistości kwiatostany mają około 3 cm średnicy. Są kremoworóżowe, drobne, zebrane na szczytach pędów w baldaszki przypominające małe kopytki. U ich podstawy znajduje się płaska rozeta długich, również kremowosrebrzystych i zaokrąglonych na końcach listków, nazywanych przez botaników pokrywkami. Pozostają one dekoracyjne jeszcze długo po przekwitnięciu kwiatów. Bylina kwitnie długo i obficie, często od czerwca do przymrozków, z przerwą w sierpniu podczas upalnego lata. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów przedłuża kwitnienie. Kwiaty są atrakcyjne dla owadów. Preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, zasobne w próchnicę, obojętne do zasadowych i stanowiska półcieniste. Można ją sadzić także na stanowisku słonecznym, ale wtedy powinna mieć lekki cień w godzinach południowych, gdyż może więdnąć. Odmiana odporna na mróz, polecana do sadzenia na rabatach oraz w pojemnikach. Najładniej prezentuje się sadzona w grupach po kilkanaście-kilkadziesiąt sztuk, tworząc w ogrodzie wyraziste, wielobarwne plamy. Nadaje się także na kwiaty cięte, które bardzo długo zachowują świeżość. Odmiana sterylna, co zabezpiecza rabaty przed samosiewem, często bardzo obfitym u innych jarzmianek. Prawdopodobnie mieszańiec *A. major* i *A. maxima*.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku

pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	październik wrzesień sierpień lipiec czerwiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego odczyn zasadowy
rodzaj gleby	gliniasta próchnicza
walory	roślina wabiąca owady zapylające ozdobne z liści/igieł ozdobne z kwiatów
zastosowanie	w grupach kwiaty cięte pojemniki, balkony, tarasy rabaty kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) ogrody skalne ogrody przydomowe
strefa	5

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Astrantia* 'Buckland' w Polsce

OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkółka Bylin