


Astrantia major 'Sunningdale Variegated'

jarzmianka większa 'Sunningdale Variegated'



Bylina dekoracyjna ze względu na ciemnozielone liście z nieregularnymi żółtymi przebarwieniami i pastelowe, różowobiałe kwiatostany. W czasie kwitnienia jej kępy mogą dorastać do 60 cm wysokości przy około 45 cm średnicy. Powiększają się przez podziemne rozłogi. Liście odziomkowe są głęboko podzielone, dłoniaste, osadzone na długich ogonkach. Wiosną są ciemnozielone z nieregularnymi żółtokremowymi plamami i przebarwieniami. Latem nieco zielenieją i są mniej kontrastowe. Kwiaty, a w rzeczywistości kwiatostany są jasne, białoróżowe, zebrane na szczytach pędów w niewielkie baldaszki, przypominające kopułki. U ich podstawy znajduje się płaska rozeta srebrzystobiałych, zaokrąglonych na końcach listków, nazywanych przez botaników pokrywkami. Pozostają one dekoracyjne jeszcze długo po przekwitnięciu kwiatów. Bylina kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty są atrakcyjne dla owadów. Preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, zasobne w próchnicę, obojętne do zasadowych i stanowiska półcieniste. Dobrze rośnie na glebach ciężkich. Rośliny można sadzić także na stanowisku słonecznym, ale wtedy powinny mieć lekki cień w godzinach południowych, gdyż mogą więdnąć. Odmiana odporna na mróz, polecana do sadzenia na rabatach, w ogrodach wiejskich, naturalistycznych i przyjaznym owadom, a także w pojemnikach. Najładniej prezentuje się sadzona w grupach po kilkanaście-kilkadziesiąt sztuk, tworząc w ogrodzie wyraziste, wielobarwne plamy. Rośliny warto dzielić co 2-3 lata. Nadaje się także na kwiaty cięte, które bardzo długo zachowują świeżość. Można je także zasuszać.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	wielobarwne, pstre lub obrzeżone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	lipiec sierpień czerwiec

nastłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego odczyn zasadowy
rodzaj gleby	gliniasta próchniczna
walory	ozdobne z kwiatów roślina wabiąca owady zapylające ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	kwiaty cięte pojemniki, balkony, tarasy rabaty kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) ogrody orientalne ogrody przydomowe suche bukiety
strefa	5

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Astrantia major* 'Sunningdale Variegated' w Polsce

OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkółka Bylin