

Monarda bradburiana

pysznogłówka Branbury'ego

Aromatyczna i miododajna bylina o luźnym, kępiastym pokroju, uprawiana w ogrodach ze względu na jasnoróżowe kwiaty masowo oblatywane przez owady zapylające. Tworzy krótkie podziemne kłącza, za pomocą których się rozrasta. Wiosną z kłączy wyrastają proste, ulistnione łodygi. Liście ciemnozielone, w zarysie owalno-lancetowate, zaostrome na wierzchołkach, na brzegu ząbkowane, do 9 cm długości i do 5 cm szerokości, ułożone w parach naprzeciw siebie oraz nakrzyżlegle. Ulistnienie jest zdrowe, niewrażliwe na porażenie przez mączniaka. Same rurkowate, dwuwargowe, różowe, są zebrane w główkowate kwiatostany na szczytach łodyg oraz w kątach górnych liści. Dolna warga kwiatów znacznie szersza niż u pysznogłówki dwoistej, z ciemnoróżowymi plamami, warga górna cienka, nitkowata. Kwiatostany od spodu są ozdobione nabiegłymi fioletowo podsadkami - wybarwionymi liśćmi podkwiatostanowymi, przypominającymi płatki kwiatów. Roślina dorasta do 60 cm wysokości, zakwita wcześniej od innych pysznogłówek - w czerwcu i kwitnie do lipca. Po ścięciu przekwitłych kwiatostanów ponownie zakwita. Kwiaty są odwiedzane przez różne gatunki owadów zapylających - pszczoły, trzmiele, ćmy i motyle. Roślina łatwa w uprawie. Preferuje gleby przepuszczalne, piaszczysto-gliniaste, umiarkowanie wilgotne, stanowiska słoneczne. Jest odporna na mróz. Co kilka lat wymaga podzielenia i przesadzenia na nowe miejsce. Polecana do sadzenia na rabatach o charakterze rustykalnym oraz w kompozycjach naturalistycznych, tworzonych w ogrodach przydomowych, osiedlowych, na działkach oraz w zieleni publicznej.

autorzy opisu tekstowego: Wiesław Szydło; Związek Szkółkarzy Polskich

zasięg geograficzny	Południowo-wschodnia i centralna część USA
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan pojedyncze
barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	lipiec czerwiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne

ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	roślina tolerancyjna
walory	roślina wabiąca owady zapylające roślina miododajna ozdobne z kwiatów
zastosowanie	rabaty kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) ogrody przydomowe ogrody osiedlowe w grupach
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Monarda bradburiana* w Polsce

OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkółka Bylin

